

MATVTINIS EXAGITANDA DISPUTATIONIBVS IN  
IN SCHOLIS MEDICORVM, DIE IOVIS XX. IANVARI

D. CLAVDIO BOYVIN DOCTORE MEDICO MODERATORE PRVDENTISSIMO.

*An Peripneumonia Pleuritide periculosa?*

**M**ORBORVM omnium vnus & idem modus: Locus verò ipse differentiam facit, nec minimam in ijs parit varietatem, Sanguis quippe inter humores temperatissimus, adeoq; eorū frænum (qui plurimus vere, paucus autumno gignitur) qualitates obtinet hominis nature cæteris congruentiores. In venoso tamen genere, prohibita diffatione, putri feruore æstuans, Synochum putridā (Causo grauiorem) progignit: extra venas oculus putrescens, calida fluxionis sobolem, ac tumore præter naturam, tanquam præcipuo symptomate comitam) in omnibus ferè partibus comitit: Quarum dissimilitudine differet res species consurgunt ex loci natura nuncupationem adeptæ: Nam tenuem cerebri menyngem obsidens, mitiorem nec non tutiorem phrenitidem: Inagnatam oculi tunicam effusus, Ophthalmiam, diarrhæa succedente sanabilem: he par occupans, hepatitidem, singultu superueniente lethalem: Renes, nephritidem, inediū (quam pueri febribus minus tolerant) ingrauescentem parit.

**D**EM sanguis ab ampliore venoso genere per interiores laterum venas ad membranam costis sustentam deturbatus, veram pleuritidem viris quàm mulieribus magis familiarē, necnon autumno & hieme, quàm vere & æstate frequentiorē simul & periculosiorē: in pulmones verò (temperamēto calidos humidos) quavis occasione receptus Peripneumoniam (a pituita quàm a bile magis legitimam) mutuat ab affecto loci nomine gignit. Verum ut a tenui & bilioso sanguine pleuritis, sic a pituitoso & crasso Peripneumonia frequentior ac tutior existit, Pleuritis enim a melancholico, ut peripneumonia a bilioso sanguine prorsus funesta. Eiusmodi verò fluxionibus gignendis haud exigua occasio est tum externus calor fundens, tum frigus exprimens. Fluit repente sanguis parti imbecillioris calore aut dolore tractus excreticis robore missus: A diuuant laxitas & amplitudo vasorum. Prima tamen ac præcipua fluxionum omnium causa partis imbecillitas censenda est.

**V**ERÆ Pleuritidis (noctu quàm interdiu, ac in sinistro quàm dextro latere grauior) dolor lateris, febris acuta, spiratio frequēs ac difficilis, tussis, pulsus paruus, frequens, durus, ac iustus: Peripneumoniam, thoracis ac spinæ dolor grauis, febris, curac tussis, molestior quàm in pleuritide, Orthopnœa, expiratio calida, malarū rubor, pulsus mollis, magnus & tumultuosus, notæ cogenitæ sunt. Temporum progressu humorum vitium detegitur, rubore sanguinem (cuius putredo bilis putredine deterior) flauit bilem (obstructionis minimè parētem) albore pituitam, liuore aut nigrore succum æreum prædente. Scretio post tussim circa initia vtriusque salutaris. Sin contra acciderit lethale signum vel robustissimū. In peripneumonia sputi vel concocti paucitas horrenda est: Sicca & æstiva pleuritides periculosissimæ, formidabiles quoq; vbi superiores partes morbo occupat. Omne sputum quod dolorem non soluit prauum: quod soluit vile. Sputum a matutinis horis in pleuritide statim initio, periculosum. Modice vero cruentum, vel inuito nullo non modo periculi metu, sed & ita certo salutis argumento apparet, ut tum phlebotomia nihil relinquatur loci.

**E**ACILIS spiratio in omnibus qui acuta febre iactantur magni est ad salutem momenti: in febribus enim spiratio subsistens malo est. Quibus in febribus dolores lateris sunt, ijs alio multa aquosa bile permixta deiciente remissio est. Sanguinis stillatio in peripneumonia ut & pleuritide inausulta: hæc copiosa hæmorrhagia salubriter, illā inausulte iudicat. Qui acidum cruetat, & quibus alius liberè profluit, rarè pleuritide (cum spasmate minus periculosa) capiuntur. A peripneumonia aut pleuritide habito diarrhæa superueniens, lethale. A pleuritide peripneumonia praua, minus tamen quàm quæ ab initio fit Spasmatia omnia infesta sunt, perniciosissima verò quæ circa thoracem accidit. Pleuritis peripneumoniam sanat, ut lethargum phrenitis, Lienteriam ructus acidus, Anguiam ad purulentiam, Leucophlegmatiam longa diarrhæa, Causum rigor superueniens: nō contra. Omnes crurum abscessus in grauioribus peripneumonijis, potissimum sputo iam in pus commutato, salutare existunt. Ex pleuritide & peripneumonia densa & exercitata corpora citius quàm otiosa intereunt. Ex hac quidem pueri & senes celerius pereunt. Ab omni verò alia inflammatione iuniores magis periclitantur.

**T**RIVSQUE affectus magnitudo remedium celere potensque efflagitat. Nullū autem phlebotomia (omnes ex æquo humores euacuante) præstātius: quæ ex eodem latere, quæ statim liberaliter celebrata oppressas vires roborat, dolores mitigat, febrem exstinguit: Proinde pueris, senibus, grauidis acuto morbo oppressis, haud omnino interdicienda. Tum non negligenda purgatio per enemata vel medicamenta ferè blandiuscula. In pleuritide verò infera, potissimum remittente febre, etiam per vehementiora pharmaca. Sed nec fomenta ad diaphoresin, nec balneum ad sudorem, & sputi maturationem, neque cleptima bechica ad expectorationem improbanda. Astringentibus hic nihil loci. Victus in principio tenuis, in statu copiosior exhibendus. Dolor eiusmodi remedijs haud cedente, cum lethali signis, necis, cum salutaribus, suppurationis (in pulmonibus & hypocondrijs valde horrendæ) subest periculi: Quam quadragesimo die vel anacatharsi, vel purulenti & acri alui fluore, vel copiosa & purulenta vrina, non expurgatam, tabes in terrens excipit. Sed haud rarè peripneumonia symptomatum magnitudine, vitium exolutione, aut præfocatione, celere ac inopinatum adfert exitium.

*Ergo Peripneumonia Pleuritide periculosa.*

ASSEREBAT PETRVS COLLIER, LVTTETIANVS, Anno salutis clō. 16 c.

Domini Doctores disputaturi.

M. IACOBS COVSINOT.  
M. PETRVS SEGVIN Prof. Reg.  
M. IOANNES DE RENOV.

M. PETRVS PHART.  
M. NICOLAVS LABOT.  
M. ANTONIVS DE CAPPE Med. Reg.

M. IOANNES MARTIN Med. Reg.  
M. CLAVDIUS BAZIN.  
M. HENRICVS BLACVOD.

